

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

TEST AU LACTOSE

⚠ IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 dose de 50g de lactose

⚠ IMPORTANT

Le test au lactose peut s'étaler sur **une période de 2h**.
Il faut s'assurer que les heures d'ouverture du centre permettent de réaliser le test.

CONDITION POUR RÉALISER LE TEST

- Il est indispensable d'**être à jeun 8h avant le test** (sauf l'eau).
- **Pas de produits laitiers la veille du test.**
- Votre médecin vous indiquera si la prise de médicament avant le test peut fausser les résultats.

NOS RECOMMANDATIONS DURANT LE TEST

- Ne pas boire, manger, fumer.
- Rester assis si possible.
- Aller aux toilettes est autorisé.
- Ne pas hésiter à signaler un malaise.
- En cas de vomissement dans la demi-heure, le test sera interrompu et postposé.

LE TEST AU LACTOSE

- La première prise de sang est effectuée à jeun sur un tube fluoré.
- Le patient absorbe 50g de lactose dissous dans 250ml d'eau.
- Quatre prélèvements consécutifs sont effectués toutes les trente minutes sur tube fluoré. (30', 60', 90' et 120').
- Un dosage de la glycémie sera également effectué.