

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

TEST D'HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE PAR VOIE ORALE

⚠ IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 flacon d'une solution glucosée (50g ou 75g)

⚠ IMPORTANT

Le test de l'hyperglycémie provoquée par voie orale peut s'étaler sur **une période de 1 à 4h** (suivant la prescription médicale). Assurez-vous que les heures d'ouverture du centre permettent de réaliser le test.

CONDITION POUR RÉALISER LE TEST

- Il est indispensable d'**être à jeun 8h avant le test** (sauf l'eau).
- Votre glycosurie doit être négative.** Le centre de prélèvement fera un dosage sur un échantillon d'urine à l'aide d'une tigette. Ce dosage préventif permettra, en cas de résultat positif, de stopper le test avant ingestion de la solution de glucose. Cette information devra parvenir au médecin. (hors grossesse).
- Votre médecin vous indiquera si la prise de médicament avant le test peut fausser les résultats.



NOS RECOMMANDATIONS DURANT LE TEST

- Ne pas boire, manger, fumer.
- Rester assis si possible.
- Aller aux toilettes est autorisé.
- Ne pas hésiter à signaler un malaise.
- En cas de vomissement dans la demi-heure, le test sera interrompu et postposé.

LE TEST HGPO, SELON LA RECOMMANDATION DU MÉDECIN :

- La première prise de sang est effectuée à jeun.
- Une solution glucosée (75gr) est ingérée en moins de cinq minutes.
- **Trois** prélèvements (0', 60' et 120') **ou cinq** prélèvements (0', 30', 60', 90' et 120') consécutifs sont effectués.
- Des prélèvements supplémentaires peuvent être demandés à 180' et 240'.

LE TEST HGPO ET LA GROSSESSE, SELON LA RECOMMANDATION DU MÉDECIN :

Selon les recommandations du GGOLFB (Groupe des gynécologues obstétriciens de langue française de Belgique) :

- Dépistage précoce (<24 semaines) :
 - Glycémie à 0' et 60' après la prise d'une solution glucosée de 50gr
- Dépistage classique (>24 semaines) :
 - Triangle de grossesse glycémie à 0', 60' et 120' après la prise d'une solution glucosée de 75gr