



VERZAMELMETHODE

BLOEDKWEK - BLOED

! **BELANGRIJK** ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Voor het uitvoeren van de bloedtest, die moet worden verricht door een bevoegd zorgverlener die is opgeleid in het afnemen van bloed in een laboratorium, bieden wij de volgende testen aan volgens de aanbevolen specificaties:



De aerobe en/of anaerobe bloedkweekfles(zen)

Een steekproeflichaam

Een compressie

Een na



Een alcoholdoekje

Een verband



De bloedbuisjes die overeenkomen met de voorgeschreven tests.

- **VOORDAT U UW MONSTERS NEEMT:** Raadpleeg uw arts om te bepalen of uw huidige behandeling (medicatie, voedingssupplementen, enz.) mogelijk tijdelijk moet worden onderbroken.



BELANGRIJK

Het bloedmonster moet worden afgenomen terwijl u nuchter bent.

Eerst worden altijd bloedkweekflessen afgenomen (zo nodig gevolgd door bloedbuisjes). Directe venapunctie heeft de voorkeur. Als er een intraveneus apparaat is geplaatst, moeten bloedkweeken gelijktijdig worden afgenomen van perifere locaties en vervolgens direct van de toegangsplaats, met 8 tot 10 ml bloed per fles (optimale hoeveelheid) indien mogelijk.

Om het risico op besmetting te beperken, is het belangrijk om een specifieke volgorde aan te houden bij het verzamelen en vullen van de buizen:

- 1 serum (rode tube)
- 2 citraat (blauwe tube)
- 3 EDTA (paarse tube)
- 4 glucose (buisgris)
- 5 met heparine behandeld (groene buis)

Het aantal en het type (kleur) buisjes worden aangepast aan de tests die voor u zijn voorgeschreven.

Niet alle tests vereisen alle vijf soorten buisjes. Als een van de kleuren niet in de kit aanwezig is, zal de zorgverlener het eerstvolgende beschikbare buisje gebruiken.

Let op de patiëntgegevens op het etiket van elke tube: naam, achternaam, geboortedatum.